

Vorlesung 21

Simpliziale Komplexe

Definition 21.1



Sei $P := \{p_0, \dots, p_n\} \subset \mathbb{R}^D$ affin unabhängig (d.h. p_0, \dots, p_n liegen nicht auf einem $(n-1)$ -dim. Lin. Raum.). Der n -Simplex zu P ist

$$\Delta = \Delta(P) = \{x \in \mathbb{R}^D \mid x = \sum_{i=0}^n t_i p_i, \sum_{i=0}^n t_i = 1, t_i \geq 0\}$$

Beispiel 21.2

$$D=3, n=4$$

$$D=2, n=3$$



Definition 21.3

Sei Δ der Simplex aufgespannt von $P = \{p_0, \dots, p_n\} \subset \mathbb{R}^D$

Sei $I \subseteq \{0, \dots, n\}$. Sei $|I| = m < n+1$. Der Simplex $\sigma_I := \Delta(\{p_i \mid i \in I\})$ aufgespannt von den Punkten in I heißt m -Facette von Δ . Wenn $|I| = n$, dann nennen wir σ_I Facette von Δ .

Der Rand von Δ ist $\Gamma(\Delta) := \{\sigma_I \mid I \subseteq \{0, \dots, n\}\}$.

Definition 21.4

Ein simplizialer Komplex K ist eine endliche Vereinigung von Simplices, s.d.


- 1) Für alle $\Delta \in K$ und alle Facetten σ von Δ ist $\sigma \in K$.

2) Für $\sigma, \Delta \in K$ mit $\overline{\Delta \cap \sigma} \neq \emptyset$, dann ist $\overline{\Delta \cap \sigma}$ eine Facette von Δ und σ .


Beispiel 21.5

$D=3$

1) Simplicialer Komplex




2) $D=3$



Dann $\overline{\Delta \cap \sigma} = \emptyset$.

\Rightarrow ist ein simplicialer Komplex.

ADER:



ist kein simplicialer Komplex.
weil $\overline{\Delta \cap \sigma}$ keine Facette.

Definition 21.6

- Sei $\Delta = \Delta(P)$, $P = [p_0, \dots, p_n] \subset \mathbb{R}^D$, ein Simplex. Die Dimension von Δ ist $\dim \Delta = n$.
- Sei K ein simplizialer Komplex. Dann ist
$$\dim K := \max_{\Delta \in K} \dim \Delta$$
- Das m -Skelett von K ist
$$K^{(m)} := \{ \Delta \in K \mid \dim \Delta \leq m \}.$$

Das 0-Skelett nennen wir die Knoten von K

Beobachtung: das 1-Skelett von K ist ein Graph.

\downarrow simplizialer Komplex

Wir können jeden Simplex $\Delta \in K \subset \mathbb{R}^D$ durch Angabe seiner Knoten $\Delta^{(0)}$ eindeutig identifizieren. Das 0-Skelett $\alpha := \Delta^{(0)}$ hat die Eigenschaft, dass: alle Teilmengen $\beta \subset \alpha$ sind das 0-Skelett eines Simplex' in K .

Definition 21.7

Ein abstrakter simplizialer Komplex A mit Knoten $\{0, \dots, n\}$ ist eine Menge von Teilmengen $\{\alpha \subset \{0, \dots, n\}\}$ s.d.: für alle $\alpha \in A$ und alle $\beta \subset \alpha$ gilt: $\beta \in A$.

Die Dimension von $\alpha \in A$ ist $\dim \alpha := |\alpha| - 1$
und $\dim A := \max_{\alpha \in A} \dim \alpha$.

\rightarrow falls $\dim A = 1$, ist A ein Graph!

Klar: Jeder geometrische simpliciale Komplex definiert einen abstrakten simplicialen Komplex.

Lemma 21.8

Sei A ein abstrakter simplicialer Komplex von Dimension $d = \dim A$. Dann kann A geometrisch in \mathbb{R}^{2d+1} realisiert werden.

Beweis

Sei A ein abstrakter simplicialer Komplex auf $\{0, \dots, n\}$.

Für alle $\alpha \in A$ gilt $|\alpha| \leq d+1$. Daher:

Für alle $\alpha, \beta \in A$ gilt $|\alpha \cup \beta| \leq 2(d+1)$.

Wir finden eine Funktion $h: \{0, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}^{2d+1}$, so dass

$h(\alpha \cup \beta)$ affin unabhängig für alle $\alpha, \beta \in A$.

Set $\alpha \in A$ fest und $\Delta_\alpha := \Delta(h(\alpha)) \subset \mathbb{R}^{2d+1}$

Behauptung: $\{\Delta_\alpha \mid \alpha \in A\}$ ist ein simplicialer Komplex.

Wir müssen zeigen: Für alle $\alpha, \beta \in A$ und $x \in \overline{\Delta_\alpha} \cap \overline{\Delta_\beta}$ gilt:
 $x \in \overline{\Delta_{\alpha \cup \beta}}$.

Dazu: Das 0-Skelett von Δ_α ist $h(\alpha)$, das 0-Skelett von Δ_β ist $h(\beta)$. D.h., wir haben für $x \in \overline{\Delta_\alpha} \cap \overline{\Delta_\beta}$:

$$x = \sum_{i \in \alpha} t_i h(i) + \sum_{j \in \beta} s_j h(j),$$

weit. $x \in \overline{\Delta(h(\alpha \cup \beta))}$ mit eindeutigen Koeffizienten t_i, s_j, \dots .

Da $x \in \overline{\Delta_\alpha}$ ist, gilt: $s_j = 0$, wenn $j \notin \alpha$.

Da $x \in \overline{\Delta_\beta}$ ist, gilt: $t_i = 0$, wenn $i \notin \beta$.

$$\Rightarrow x = \sum_{i \in \alpha \cap \beta} t_i h(i) + \sum_{j \in \alpha \setminus \beta} s_j h(j) \in \overline{\Delta_{\alpha \cap \beta}}. \quad \square$$

Wie ordnen wir Daten einem simplicialen Komplex zu?

Oft haben Daten eine natürliche Interpretation als simpliciale Komplexe. Zum Beispiel, ang. die Daten sind gegeben durch ein Netzwerk von $n!$ Objekten $\{0, \dots, n\}$, dann kann ein simpl. Komplex A Beziehungen in diesem Netzwerk modellieren: $\alpha \in A$, falls die Objekte in α eine gemeinsame Beziehung.

In anderen Situationen haben wir Datenpunkte im \mathbb{R}^D .

In diesem Fall gibt es zwei zentrale Ansätze den Daten einen Komplex zuzuordnen.

Definition 21.9

Sei $P = \{p_0, \dots, p_n\} \subset \mathbb{R}^D$ eine Datenmenge. Set $r > 0$.

1) Der Čech-Komplex bzgl. P zum Level r ist

$$C_r(P) := \{ \alpha \subset \{0, \dots, n\} \mid \bigcap_{i \in \alpha} B_r(p_i) \neq \emptyset \},$$


wobei $B_r(p) := \{q \in \mathbb{R}^D \mid \|p - q\| < r\}$.

2) Der Vietoris-Rips-Komplex bzgl. P zum Level r ist


$$VR_r(P) := \{ \alpha \subset \{0, \dots, n\} \mid \max_{i,j \in \alpha} \|p_i - p_j\| \leq 2r \}.$$

Beispiel 21.10


(Kreise vom Radius r!)



$$C_r(P) =$$



$$VR_r(P) =$$



Dreieck ist gefüllt, weil

$$\|p_0 - p_1\| \leq 2r$$

$$\|p_1 - p_2\| \leq 2r$$

$$\|p_2 - p_0\| \leq 2r$$